

Tabela 6
Table

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, ołowiu i cynku na głębokości 0,0–0,3 i 0,8–1,0 m na arkuszu Katowice

Share of areas with various content of cadmium, lead and zinc in topsoil (0.0–0.3 m) and subsoil (0.8–1.0 m) at Katowice Sheet

Pierwiastek Element	Zawartość Content mg/kg	Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil 0,0–0,3 m		Podglebie Subsoil 0,8–1,0 m	
		Obszar/Area		Obszar/Area	
		km ²	%	km ²	%
Cd	<1	31,84	38,60	69,33	84,04
	1–4	35,70	43,27	10,77	13,06
	4,1–16	13,16	15,95	2,10	2,54
	>16	1,80	2,18	0,30	0,36
Pb	<25	6,95	8,43	66,27	80,33
	25–100	41,66	50,49	12,05	14,60
	101–500	31,53	38,22	3,66	4,44
	>500	2,36	2,86	0,52	0,63
Zn	<100	37,13	45,00	66,87	81,05
	100–500	32,71	39,66	13,02	15,78
	501–2500	11,42	13,84	2,31	2,81
	>2500	1,24	1,50	0,30	0,36