

Tabela 6  
Table

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, ołowiu i cynku na głębokości 0,0–0,3 i 0,8–1,0 m na arkuszu Imielin

Share of areas with various content of cadmium, lead and zinc in topsoil (0.0–0.3 m) and subsoil (0.8–1.0 m) at Imielin Sheet

Pierwiastek Element	Zawartość Content  mg/kg	Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil  0,0–0,3 m		Podglebie Subsoil  0,8–1,0 m	
		Obszar/Area		Obszar/Area	
		km <sup>2</sup>	%	km <sup>2</sup>	%
Cd	<1	35,85	43,46	77,60	94,06
	1–4	41,52	50,32	3,90	4,72
	4,1–16	4,93	5,98	1,00	1,22
	>16	0,20	0,24	–	–
Pb	<25	14,00	16,96	74,14	89,87
	25–100	62,04	75,21	6,71	8,13
	101–500	6,33	7,67	1,51	1,83
	>500	0,13	0,16	0,14	0,17
Zn	<100	50,78	61,55	75,30	91,27
	100–500	28,20	34,17	6,27	7,60
	501–2500	3,52	4,28	0,93	1,13
	>2500	–	–	–	–