

Tabela 6
Table 6

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, ołowiu i cynku na głębokości 0,0–0,3 i 0,8–1,0 m na arkuszu Jaworzno

Share of areas with various content of cadmium, lead and zinc in topsoil (0.0–0.3 m) and subsoil (0.8–1.0 m) at Jaworzno Sheet

Pierwiastek Element	Zawartość Content mg/kg	Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil 0,0–0,3 m		Podglebie Subsoil 0,8–1,0 m	
		Obszar/Area		Obszar/Area	
		km ²	%	km ²	%
Cd	<1	13,67	16,52	56,37	68,32
	1–4	45,98	55,71	17,77	21,54
	4,1–16	20,04	24,36	5,82	7,06
	>16	2,81	3,41	2,54	3,08
Pb	<25	7,20	8,69	51,29	62,17
	25–100	35,17	42,59	17,47	21,18
	101–500	36,02	43,75	10,68	12,94
	>500	4,11	4,97	3,06	3,71
Zn	<100	15,11	18,31	51,21	62,08
	100–500	43,52	52,75	18,29	22,17
	501–2500	21,76	26,38	10,38	12,58
	>2500	2,11	2,56	2,62	3,17