

Tabela 6
Table

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, ołowiu i cynku na głębokości 0,0–0,3 i 0,8–1,0 m na arkuszu Bieruń Stary

Share of areas with various content of cadmium, lead and zinc in topsoil (0.0–0.3 m) and subsoil (0.8–1.0 m) at Bieruń Stary Sheet

Pierwiastek Element	Zawartość Content mg/kg	Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil 0,0–0,3 m		Podglebie Subsoil 0,8–1,0 m	
		Obszar/Area		Obszar/Area	
		km ²	%	km ²	%
Cd	<1	41,86	50,75	77,58	94,04
	1–4	36,90	44,72	4,59	5,56
	4,1–16	3,67	4,45	0,26	0,32
	>16	0,07	0,08	0,07	0,08
Pb	<25	14,19	17,20	75,72	91,79
	25–100	61,28	74,28	6,25	7,57
	101–500	6,66	8,07	0,46	0,56
	>500	0,37	0,45	0,07	0,08
Zn	<100	50,02	60,63	76,53	92,76
	100–500	31,23	37,86	5,71	6,92
	501–2500	1,18	1,43	0,26	0,32
	>2500	0,07	0,08	–	–