

Tabela 7/Table 7

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, cynku i ołowiu na głębokości 0,0-0,3 i 0,8-1,0 m na arkuszu Myślachowice

Share of areas with various content of cadmium, lead and zinc in topsoil (0.0-0.3 m) and subsoil (0.8-1.0 m) at Myślachowice Sheet

Pierwiastek Element	Zawartość Content mg/kg	Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil 0,0-0,3 m		Podglebie Subsoil 0,8-1,0 m	
		Obszar/Area		Obszar/Area	
		km ²	%	km ²	%
Cd	<1	20,9	25,3	51,9	62,9
	1-4	36,6	44,4	22,1	26,8
	4-16	23,2	28,1	7,5	9,1
	>16	1,8	2,2	1,0	1,2
Pb	<25	11,1	13,5	45,4	55,0
	25-100	28,6	34,6	22,4	27,2
	100-500	39,6	48,0	12,2	14,8
	>500	3,2	3,9	2,5	3,0
Zn	<100	26,6	32,2	48,0	58,2
	100-500	36,7	44,5	23,1	28,0
	500-2500	17,9	21,7	10,4	12,6
	>2500	1,3	1,6	1,0	1,2