

Tabela 6
Table 6

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, ołowiu i cynku na głębokości 0,0-0,3 i 0,8-1,0 m na arkuszu Dąbrowa Górnicza

Share of areas with various content of cadmium, lead and zinc in topsoil (0.0–0.3 m) and subsoil (0.8–1.0 m) at Dąbrowa Górnicza Sheet

| Pierwiastek Element | Zawartość Content mg/kg | Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil 0,0–0,3 m | | Podglebie Subsoil 0,8–1,0 m | |
|------------------------|-----------------------------------|---|-------|---------------------------------------|-------|
| | | Obszar/Area | | Obszar/Area | |
| | | km ² | % | km ² | % |
| Cd | <1 | 9,85 | 11,94 | 39,44 | 47,81 |
| | 1–4 | 47,57 | 57,65 | 35,33 | 42,82 |
| | 4,1–16 | 23,41 | 28,38 | 7,13 | 8,64 |
| | >16 | 1,67 | 2,03 | 0,60 | 0,73 |
| Pb | <25 | 4,90 | 5,93 | 33,13 | 40,15 |
| | 25–100 | 34,89 | 42,27 | 34,02 | 41,24 |
| | 101–500 | 40,09 | 48,57 | 14,15 | 17,15 |
| | >500 | 2,62 | 3,23 | 1,20 | 1,46 |
| Zn | <100 | 7,06 | 8,56 | 35,03 | 42,46 |
| | 100–500 | 45,90 | 55,63 | 35,93 | 43,55 |
| | 501–2500 | 27,93 | 33,86 | 10,24 | 12,41 |
| | >2500 | 1,61 | 1,95 | 1,30 | 1,58 |