

Tabela 7/Table 7

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, ołowiu i cynku na głębokości 0,0–0,3 i 0,8–1,0 m na arkuszu Nowa Góra

Share of areas with various content of cadmium, lead and zinc in topsoil (0.0–0.3 m) and subsoil (0.8–1.0 m) at Nowa Góra Sheet

Pierwiastek Element	Zawartość Content mg/kg	Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil 0,0–0,3 m		Podglebie Subsoil 0,8–1,0 m	
		Obszar/Area		Obszar/Area	
		km ²	%	km ²	%
Cd	<1	14,1	17,1	43,5	52,7
	1–4	45,3	54,9	26,1	31,6
	4–16	19,2	23,3	11,1	13,5
	>16	3,9	4,7	1,8	2,2
Pb	<25	1,1	1,5	30,1	36,6
	25–100	36,4	44,1	30,6	37,2
	100–500	36,7	44,3	17,0	20,3
	>500	8,3	10,1	4,8	5,9
Zn	<100	19,5	23,6	39,8	48,2
	100–500	44,7	54,2	29,4	35,6
	500–2500	14,9	18,1	12,1	14,7
	>2500	3,4	4,1	1,2	1,5