

Tabela 6
Table 6

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, ołowiu i cynku na głębokości 0,0–0,3 i 0,8–1,0 m na arkuszu Libiąż

Share of areas with various content of cadmium, lead and zinc in topsoil (0.0–0.3 m) and subsoil (0.8–1.0 m) at Libiąż Sheet

Pierwiastek Element	Zawartość Content mg/kg	Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil 0,0–0,3 m		Podglebie Subsoil 0,8–1,0 m	
		Obszar/Area		Obszar/Area	
		km ²	%	km ²	%
Cd	<1	32,97	39,96	70,13	85,00
	1–4	39,68	48,10	9,80	11,88
	4,1–16	7,80	9,46	1,79	2,17
	>16	2,05	2,48	0,78	0,95
Pb	<25	9,92	12,02	63,83	77,37
	25–100	50,95	61,76	12,80	15,52
	101–500	18,31	22,19	4,58	5,55
	>500	3,32	4,03	1,29	1,56
Zn	<100	39,82	48,26	64,69	78,41
	100–500	32,32	39,18	13,02	15,78
	501–2500	8,89	10,78	3,86	4,68
	>2500	1,47	1,78	0,93	1,13