

Tabela 6

Table 6

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, ołowiu i cynku na głębokości 0,0 0,3 i 0,8 1,0 m na arkuszu Strzemieszyce

Share of areas with various content of cadmium, lead and zinc in topsoil (0.0 0.3 m) and subsoil (0.8 1.0 m) at Strzemieszyce Sheet

Pierwiastek Element	Zawartość Content mg/kg	Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil 0,0 0,3 m		Podglebie Subsoil 0,8 1,0 m	
		Obszar/Area		Obszar/Area	
		km ²	%	km ²	%
Cd	<1	16,12	19,54	68,44	82,97
	1-4	49,69	60,23	11,25	13,63
	4,1-16	14,14	17,14	1,82	2,20
	>16	2,55	3,09	0,99	1,20
Pb	<25	10,13	12,28	65,22	79,06
	25-100	43,63	52,89	12,65	15,33
	101-500	25,93	31,43	3,56	4,31
	>500	2,81	3,40	1,07	1,30
Zn	<100	19,94	24,17	64,31	77,96
	100-500	42,88	51,97	12,81	15,53
	501-2500	17,01	20,62	4,22	5,11
	>2500	2,67	3,24	1,16	1,40